

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【算定条件】

1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるため、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
 - イ) 肺炎
 - ロ) 尿路感染症
 - ハ) 帯状疱疹（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る）
 - ニ) 慢性心不全の増悪
4. 算定する場合にあつては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

令和5年度 所定疾患施設療養費の算定状況

介護老人保健施設 けんちの苑すみだ川

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。

【令和5年4月】

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
尿路感染症	4月28日		計7日	視診	37.7℃			
			1	尿検査		レボフロキサシン 250mg	2錠	2×朝夕
			6			レボフロキサシン 250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	3月24日		6日	尿検査		ミノマイシン50mg	4錠	2×朝夕
尿路感染症			計5日					
	4月24日		1	尿検査		セフカペンピボキシル100mg	3錠	3×毎食後
			3			セフトリアキソン ナトリウム注射 静注用	2g	2回/日
			1			セフカペンピボキシル100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	4月19日		10日	視診	37.8℃			

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
			5日	尿検査		オーグメンチン配合錠RS (250) / サワシリンCP (250)	各3錠	3×毎食後
			5日			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×朝
						ホスミン錠250mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	3月24日		4日	尿検査		レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×朝
尿路感染症	4月25日		5日	尿検査		セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	4月17日		7日	尿検査		バクタ配合錠	4錠	2×朝夕
尿路感染症	4月8日		3日	尿検査		セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
			5日			セフトリアキソンナトリウム注射 静注用 + 生食注50mL	1g	2回/日
尿路感染症	3月30日		8日	尿検査	38.3℃	バクタ配合錠	4錠	2×朝夕
尿路感染症	4月25日		2日	尿検査	38.0℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
肺炎	4月27日		3日	視診	rales3+	セフトリアキソンナトリウム注射 静注用 + 生食注50mL	1g	1回/日

【令和5年5月】

尿路感染症	5/1	5/1	5日	尿検査	発熱 38.1℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
		5/2-5				レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
帯状疱疹	5/3	5/3	7日	視診	紅斑・水疱	バラシクロビル錠500mg	4錠	2×朝夕
帯状疱疹	5/12	5/12	7日	視診	発疹	バラシクロビル錠501mg	4錠	2×朝夕
蜂窩織炎	5/4	5/4	12日	視診	浮腫・発赤・熱感	L-ケフレックス顆粒500mg	2包	2×朝夕
尿路感染症	5/1	5/1	5日	尿検査	39.3℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
		5/2-5				レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
尿路感染症	5/5 再評価		14日			セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	5/19	5/19	7日	尿検査	38.8℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	5/17	5/17	7日	尿検査	37.9℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
		5/18-23				レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	5/29	5/29	3日 (5日)	尿検査	38.0℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×昼
		5/30-6/2				レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×昼
尿路感染症	5/12	5/12	4日	尿検査	37.1℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
	5/18	5/18	3日	尿検査	37.3℃ UTI再燃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	4/28	4/28		尿検査	37.7℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
		5/1-/4	4日			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	5/26	5/26	6日(7日)	尿検査	37.0℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
		5/27-6/1				レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	5/12	5/12	4日	尿検査	37.7℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	5/27	5/27	5日(7日)	尿検査	38.0℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	5/23	5/23	3日	尿検査	38.8℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×朝
		5/24-25				レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×朝
尿路感染症	5/5	5/5	7日		尿検査はできず UTI疑い	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	5/2	5/2	6日	尿検査	37.4℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	5/8	5/8	7日	尿検査	39.4℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後

【令和5年6月】

尿路感染症	5/26	5/26	5/26-6/	尿検査	37.0℃			
			4日 (6/1-6/4)			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
尿路感染症	6/6	6/6	9日		再燃のため	バクタ配合錠	4錠	2×朝夕
尿路感染症	6/19	6/19	2日	尿検査		セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
			5日	血液検査	CRP17.7 経口剤効果不十分のため	ロセフィン静注用+生食注50mL	2g	2回/日
尿路感染症	5/29	5/29	5/29-6/20日	尿検査	38.0℃			
			6/1-6/3			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
			6/4-6/20			ミノサイクリン錠50mg	4錠	2×朝夕
尿路感染症	6/27	6/27	6/27-7/4日	尿検査		バクタ配合錠	4錠	2×朝夕
			(6/27-6/30)					
肺炎	6/7	6/7	3日	その他	発熱・咳・痰・肺雑	ロセフィン静注用+生食注50mL	2g	2回/日
			9日			セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
蜂窩織炎	6/3	6/3	7日	視診	右下腿発赤・腫脹	レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×朝
尿路感染症	6/13	6/13	7日	尿検査	排尿痛	バクタ配合錠	4錠	2×朝夕
尿路感染症	6/9	6/9	10日	尿検査		レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×昼
		6/10-6/18				レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×昼
尿路感染症	6/8	6/8	15日	尿検査	38.2℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
尿路感染症	6/3	6/3	3日	尿検査	38.3℃	レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
	6/23	6/23	7日	尿検査	37.6℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
		6/24-6/29				レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	5/27	5/27		尿検査				
		6/1-2	2日			セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
尿路感染症	6/19	6/19	1日	尿検査	38.2℃	セフカペンピボキシ シル錠100mg	3錠	3×毎食後
肺炎	6/20	6/20	7日	その他	CRP17.7 WBC12500のため 経口剤中止 肺炎疑いもあり	ロセフィン静注用 +生食注 50mL	2g	2回/日
		6/27	4日			レボフロキサシン 錠250mg	2錠	1×昼

【令和5年7月】

肺炎	7/19	7/19	6日	その他	39.0℃ 痰がらみ SPO ₂ 87%	オーグメンチン配 合錠RS (250)	3錠	3×毎食後
蜂窩織炎	7/12	7/12	11日	視診	CRP8.3 2 左踝腫 脹など	オーグメンチン配 合錠RS (250)	3錠	3×毎食後
尿路感染症	7/18	7/18	5日	尿検査		セフカペンピボキ シル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	7/20	7/20	4日	尿検査	尿混濁	バクタ配合錠	4錠	2×朝夕
尿路感染症	7/3	7/3	5日	尿検査	37.5℃ 尿混濁	ホスミン錠250 mg	6錠	3×毎食後
尿路感染症	6/27	6/27		尿検査				
		7/1-7/4	3日			バクタ配合錠	4錠	2×朝夕
尿路感染症	7/11	7/11	8日	尿検査		ケフール CP(250)	3錠	3×毎食後
			2日			ホスミン錠250 mg	6錠	3×毎食後
尿路感染症	7/17	7/17	4日		38.0℃	セフカペンピボキ シル錠100mg	3錠	3×毎食後
			4日			ロセフィン静注用 +生食注 50mL	2g	2回/日
			2日			ロセフィン静注用 +生食注 50mL	1g	1回/日
尿路感染症	6/23	6/23	1日	尿検査	37.6℃	レボフロキサシン 錠250mg	2錠	2×朝夕

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
			6日			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	7/4	7/4	1日	尿検査	37.5℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×昼
			4日			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×昼
尿路感染症	7/21	7/21	5日	その他	37.8℃ CRP高値 WBC8,300	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	7/21	7/21	3日	尿検査	37.7℃ 悪寒など	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	7/3	7/3-7/8	5日	尿検査	38.1℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
		7/8-7/14	6日			オーグメンチン配合錠RS(250) / サワシリンCP(250)	3錠	3×毎食後
尿路感染症		7/31	1日 (7/31-8/6)	尿検査		レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×昼
蜂窩織炎	7/3	7/3	7日	その他	右足背部腫脹 発赤熱感あり	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	7/29	7/29-8/4	計7日 (1日)	尿検査		レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×昼
			(6日)			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×昼

【令和5年8月】

尿路感染症	7/31	7/31		尿検査				
			6日 (8/1-8/6)			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×昼
尿路感染症	7/29	7/29		尿検査				
			4日 (8/1-8/4)			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×昼
尿路感染症	8/5	8/5	計4日 (2日)	尿検査		レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
			(2日)			ロセフィン静注用 + 生食注 50mL	2g	1回/日
尿路感染症	8/9	8/9	7日	尿検査	発熱37.7	レボフロキサシン 錠250mg	2錠	1×夕
尿路感染症	8/12	8/12	5日	尿検査	血膿尿・精	ケフール CP(250)	6錠	2×朝夕
尿路感染症	8/15	8/15	6日	尿検査	発熱39.1	ロセフィン静注用 + 生食注 50mL	2g	2回/日
尿路感染症	8/11	8/14	7日	尿検査	排尿痛	L-ケフレックス顆 粒500mg	2包	2×朝夕
尿路感染症	8/21	8/21	計5日 (1日)	尿検査	発熱38.1	レボフロキサシン 錠250mg	2錠	1×昼
			(4日)			レボフロキサシン 錠250mg	1錠	1×昼
蜂窩織炎	8/17	8/17	計16日	視診	右足背 腫脹 熱 感・発赤	ケフール CP(250)	3錠	3×毎食後
尿路感染症	8/22	8/22	計11日 (1日)		発熱38.1	ホスミン錠250 mg	8錠	4回/毎食 後・寝る前
			(10日)			ロセフィン静注用 + 生食注 50mL	2g	2回/日

【令和5年9月】

肺炎	9/29	9/29	2 (9/29 -3)	視診	コロナ(-) 37.5℃ 痰がらみ・む せこみ	ロセフィン静注用 + 生食注	2g	1回/日
尿路感染症	9/4	9/4	計6日 2日	尿検査	熱(-)	レボフロキサシン 錠250mg	2錠	1×夕
			4日			レボフロキサシン 錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	9/23	9/23	7日	尿検査	39.1℃	レボフロキサシン 錠250mg	1錠	1×昼
尿路感染症	9/28	9/28	計6日 2日 (9/29- 30)	尿検査	UTI歴あり	ロセフィン静注用 + 生食	1g	1回/日
尿路感染症	8/22	8/22			発熱38.1℃			

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
			15日 (8/22 - 9/15)			ホスミン錠250mg	8錠	4回/毎食後・寝る前
尿路感染症	9/12	9/12	4日	尿検査	36.9℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
蜂窩織炎	9/18	9/18	計7日 9/18	血液検査	WBC:25,000 CRP:10.7 足背発赤	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
			9/19			レケフレックス顆粒500mg	2包	2×朝夕
			9/20-24			ロセフィン静注用+生食	2g	2回/日
尿路感染症	9/8	9/8	7日	尿検査	38.7℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	9/18	9/18	計7日 1日	尿検査	37.5℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕

【令和5年10月】

尿路感染症	9/30	9/30	7日 (10/1-7)	尿検査	38.0℃	ホスミン錠250mg	8錠	4回/毎食後・寝る前
尿路感染症	10/5	10/5	7日	尿検査	37.7℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	10/9	10/9	7日	尿検査	38.2℃	バクタ配合錠	4錠	2×朝夕
尿路感染症	10/5	10/5	計4日 1日	尿検査		レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×昼
			3日			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×昼
尿路感染症	10/12	10/12	9日		リバーサイド病院で診断・服用指示	ケフラルCP(250)	3錠	3×毎食後
尿路感染症	10/28	10/28	4日 (10/28-11/6)	尿検査	39.3℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
帯状疱疹	10/28	10/28	4日 (10/28-11/4)	視診	発疹	バラシクロビル錠500mg	6錠	3×毎食後

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
帯状疱疹	10/1/9	10/9	7日	視診	発疹(左側腹から背部)	バラシクロビル錠 500mg	6錠	3×毎食後
尿路感染症	10/16	10/16	9日	尿検査	37.6℃ 尿混濁	ミノサイクリン錠 50mg	4錠	2×朝夕
尿路感染症	10/16	10/16	7日	尿検査	38.5℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	10/7	10/7	7日	尿検査		レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×朝
尿路感染症	10/11	10/11	5日	尿検査	37.8℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後

【令和5年11月】

尿路感染症	10/28	10/28		尿検査	39.3℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
			6日 (11/1-11/6)					
帯状疱疹	10/28	10/28		視診	発疹	バラシクロビル錠 500mg	6錠	3×毎食後
			4日 (11/1-11/4)					
尿路感染症	11/3	11/3	2日	尿検査	38.6℃	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
尿路感染症	11/9	11/9	1日 11/9:ロセフィン 1gのみ	尿検査	37.6℃・ 膿尿	ロセフィン静注用 +生食	2g	2回/日
尿路感染症	11/15	11/15	8日	尿検査	38.0℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	11/16	11/16	14日 (11/16-30)	尿検査	37.9℃	オーグメンチン配合錠RS (250)	3錠	3×毎食後
尿路感染症	11/20	11/20	計11日	尿検査	39.0℃			
			2日 (11/20-21)			ケフラル CP(250)	3錠	3×毎食後
			9日 (11/22-30)			ロセフィン静注用 +生食	2g	2回/日
尿路感染症	11/22	11/22	8日	尿検査	37.8℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
尿路感染症	11/22	11/22	8日	尿検査	37.0 (アセトアミノフェン2T服用後)	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
肺炎	11/24	11/24	5日	視診	SO ₂ 85% 痰、咽込み、捻髪音など	オーグメンチン配合錠RS (250)	3錠	3×毎食後
尿路感染症	11/28	11/28	11月:3日 (12月:3日)	尿検査	38.3℃			
			11/28			レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
			11/29-30			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	11/28	11/28	11月:3日 (12月:3日)	尿検査	38.0℃			
			11/28			レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
			11/29-30			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕

【令和5年12月】

尿路感染症	11/28	11/28		尿検査	38.3℃			
			12月:3日			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	11/28	11/28		尿検査	38.0℃			
			12月:3日			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	12/6	12/6	5日	尿検査	血尿	セフカペンピボキシル錠100mg	2錠	2×朝夕
尿路感染症	12/4	12/4	5日	尿検査	38.5℃			
			12/4			レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
			12/5-8			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
【令和6年1月】								
尿路感染症	1/2	1/2	6日	尿検査	38.9℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
蜂窩織炎	1/1	1/2	8日	視診	右腕 疼痛 発赤・腫脹	サワシリン(250)	3錠	3×毎食後
尿路感染症	1/17	1/17	8日	尿検査	37.9℃	バクタ配合錠	4錠	2×朝夕
尿路感染症	1/15	1/15	7日	尿検査	37.8	オーグメンチン配合錠RS(250)	3錠	3×毎食後
尿路感染症	1/22	1/22	6日	尿検査	膿尿	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	1/25	1/25	計6日 1日	尿検査	1/24 38	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×昼
			5日			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×昼
蜂窩織炎	1/20	1/20	8日	視診	右足趾間白癬による右足背部感染	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
帯状疱疹	1/31	1/31	1日(1月中) 計7日	視診	右肩から背部へ発疹 痛みあり	バラシクロビル錠500mg	4錠	2×朝夕
【令和6年2月】								
帯状疱疹	1/31	1/31	6日(2月中) 計7日	視診	右肩から背部へ発疹 痛みあり	バラシクロビル錠500mg	4錠	2×朝夕
尿路感染症	2/20	2/20	計7日 1日	尿検査	2/19 血尿	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×夕
			6日			レボフロキサシン錠250mg	1錠	1×夕
尿路感染症	2/21	2/21	6日	尿検査	37.5℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	2/19	2/19	3日	尿検査	尿の汚れ	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	2/27	2/27	8日	尿検査	37.2℃・尿の汚れ	ミノサイクリン錠50mg	2錠	2×朝夕
【令和6年3月】								

診断名	診断日	治療開始日	治療期間	根拠	所見	使用薬剤	一日量	用法
尿路感染症	2/27	2/27	5日(計8日) (3/1-3/5)	尿検査	37.2℃・尿の汚れ	ミノサイクリン錠 50mg	2錠	2×朝夕
带状疱疹	3/29	3/29	3日 (計7日)	その他	もざわ眼科受診 眼部带状疱疹	バラシクロビル錠 500mg	2錠	2×朝夕
带状疱疹	3/8	3/8	8日	視診		バラシクロビル錠 500mg	4錠	2×朝夕
尿路感染症	3/11	3/11	8日	尿検査	38.3℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	3/11	3/11	6日	尿検査	38.3℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	3/11	3/11	6日	尿検査	38.0℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	3/13	3/13	6日	尿検査	38.1℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	3/7	3/7	9日	尿検査	38.4℃	セフカペンピボキシル錠100mg	3錠	3×毎食後
尿路感染症	3/26	3/26	6日	尿検査	38.4℃	ホスミン錠250mg	6錠	3×毎食後
肺炎	3/21	3/21	3日(計5日)	その他	発熱・肺雑・SAD75%低下	ロセフィン静注用+生食	2g	2回/日
			2日				ロセフィン静注用+生食	1g
蜂窩織炎	3/25	3/25	7日(計11日) 3/25-3/31	視診	左足背から下腿まで熱感・発赤腫脹	L-ケフレックス顆粒500mg	2包	2×朝夕
尿路感染症	3/27	3/27	5日(計12日) 3/27-3/31	血液検査	膿尿 CRP:3.6	レボフロキサシン錠250mg	2錠	1×昼